

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A

ការការពារ និង
ការទប់ស្កាត់

តើអ្វីជាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A គឺជាជំងឺឆ្លងដែលបណ្តាលមកពីមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A ។ វាបង្កអោយកើតឡើងនៅលើស្បែក ឬ នៅភ្នែក មានអាការៈគ្រុន អស់កំលាំង ក្អក ទឹកនោមពណ៌ក្រមៅ លាមកពណ៌ស្លេក ឬមានរាក្បួស ។ មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A ចម្លងតាមលាមក ឬ តាមឈាម ដោយតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគនេះ ឬតាមការទទួលទានអាហារឬភេសជ្ជៈដែលមានមេរោគនេះ ។ មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A អាចនៅជាប់លើផ្ទៃវត្ថុ ឬទីតាំងបានជាច្រើនខែខែ ។ ការសំអាត និងសំលាប់មេរោគអោយបានត្រឹមត្រូវ ជួយការពារ និងទប់ស្កាត់ ការរាលដាលនៃមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A នេះបាន ។

ត្រូវធ្វើការសំអាត និងសំលាប់មេរោគលើផ្ទៃដែលមានការប៉ះជាញឹកញាប់ ៖



ក្តារចុចកុំព្យូទ័រ



ដៃទ្វារ



កៅអីសំរាប់កូនក្មេង



ទូរស័ព្ទ



បង្គាន់ដៃ



ផ្ទៃនៅចង្ក្រាន



ផ្ទៃនានានៅក្នុងបន្ទប់ទឹក



ប្រដាប់ប្រដារក្នុងលេង/ឧបករណ៍កីឡា



ប្រដាប់បញ្ជាទូរស័ព្ទ



បន្ទះកុងតាក់ចុចភ្លើង



កៅអី ឬតុ



រទេះជនពិការ/ឧបករណ៍ជំនួយការដើរ

គន្លឹះនៃការសំអាត



ប្រើទឹកថ្នាំសំអាតនៅកន្លែងដែលមានប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលបានល្អ



ដាក់ទឹកថ្នាំសំអាតអោយឆ្ងាយពីអាហារ និងឆ្ងាយពីកន្លែងទុកអាហារ



កុំលាយទឹកថ្នាំសំអាតចូលគ្នា



ព្យាយាមចាប់កាន់វត្ថុដែលមានមេរោគអោយបានតិចបំផុត



ចោលឧបករណ៍សំអាតដែលបានប្រើរួចក្នុងធុងឬថង់អោយបានជិតល្អ

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A

ការការពារ និង ការទប់ស្កាត់

ការសំអាតកំអ្កត ឬ លាមក

1. ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពាក់ការពារខ្លួន (PPE) ដូចជា៖ ស្រោមដៃ ម៉ាស និងស្រោមការពារខោអាវរបស់អ្នក ។
2. បាំងកន្លែងដែលមានកំអ្កត ឬលាមក អោយបានឆាប់រហ័ស កុំអោយមានការដើរឆ្លងកាត់ ។
3. សំអាតកំអ្កតឬលាមកដែលអ្នកមើលឃើញ ដោយប្រើឧបករណ៍ដែលជាក់ទឹក និងប្រើបានតែមួយដងហើយចោល (ប្រភេទក្រដាស ឬក្រណាត់ដែលជាក់ទឹក និងប្រើតែមួយដងចោល) ហើយ កាត់បន្ថយការប្រើថ្នាំបាញ់ ។
4. បោះចោលក្រដាសឬក្រណាត់ដែលកខ្វក់នោះនៅក្នុងថង់អោយបានជិតល្អ ។
5. សំលាប់មេរោគនៅទីកន្លែង និងវត្ថុដែលនៅជិតនោះ ដោយប្រើថ្នាំសំអាតសំលាប់មេរោគដែលអាចកំចាត់មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A បាន ។ សូមមើល “ទឹកថ្នាំសំលាប់មេរោគដែលមានប្រសិទ្ធភាព” ខាងក្រោម ។
6. ដោះស្រោមដៃជាមុន បន្ទាប់មកដោះម៉ាស និងស្រោមការពារខោអាវ (តាមលំដាប់ដូចដែលបានរៀបរាប់) និងចោលគ្រឿងទាំងនេះនៅក្នុងថង់អោយបានជិតល្អ មុននឹងចេញពីកន្លែងដែលបានធ្វើការសំអាត ។
7. ពាក់ស្រោមដៃថ្មីដើម្បីយកថង់សំរាមទាំងនោះទៅចោល ដោយការពារកុំអោយថង់សំរាមនោះប៉ះនឹងខោអាវរបស់អ្នក ។
8. លាងសំអាតដៃអោយបានជិតដល់ ជាមួយសាប៊ូ និងទឹក យ៉ាងតិច 20 វិនាទី ។

ទឹកថ្នាំសំលាប់មេរោគដែលមានប្រសិទ្ធភាព

ត្រូវពាក់ស្រោមដៃជានិច្ច និងពាក់ស្រោមការពារខោអាវ នៅពេលប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំសំលាប់មេរោគ ។
 ល្បាយទឹកក្លរីនអាចប្រើបានតែលើផ្ទៃដែលលាត និងរាបស្មើតែប៉ុណ្ណោះ ។



1 $\frac{2}{3}$ ខ្នាតcup នៃ bleach + **1** ទឹក 1 ហ្គាឡុង = **ល្បាយទឹកក្លរីន**

លាយចូលគ្នា និងប្រើល្បាយទឹកក្លរីននេះ ក្នុងរយៈពេល 20 នាទី ។
 ទុកចោលរយៈពេល 1 នាទី បន្ទាប់មកលាងសំអាតជាមួយទឹកធម្មតា ។

អ្នកអាចប្រើទឹកថ្នាំសំលាប់មេរោគដទៃទៀតបាន ប្រសិនបើមានស្លាកសញ្ញាសរសេរ “ប្រើសំរាប់សំលាប់មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A (“Hepatitis A use”) ។ ទឹកថ្នាំដែលមានជាតិ Quaternary Ammonium មិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសំលាប់មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A ទេ ។ សំរាប់ផ្ទៃដែលមិនអាចប្រើជាតិថ្នាំ bleach បាន សូមប្រើទឹកថ្នាំដែលមានស្លាកសញ្ញាសំរាប់សំលាប់មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ A ។