Hoja de Hechos
Sífilis

¿QUÉ ES LA SÍFILIS?

La sífilis es causada por una bacteria llamada *Treponema pallidum*. La sífilis casi se erradicó en 2000, pero desde entonces Long Beach ha visto un aumento constante. Históricamente, las tasas han sido más altas entre los hombres que tienen sexo con hombres, sin embargo, también estamos viendo que las tasas aumentan en las mujeres. La sífilis se puede curar con antibióticos. Si no se trata, la sífilis puede provocar daños permanentes en el corazón, el cerebro y otros órganos. Tener sífilis puede aumentar sus posibilidades de transmitir o adquirir el VIH.

¿QUIÉN CONTRAE INFECCIONES DE SÍFILIS?

La sífilis se puede transmitir durante las relaciones sexuales vaginales, anales, orales o el contacto de piel a piel con alguien que tiene una infección de sífilis. Las mujeres embarazadas con sífilis pueden transmitirla a su hijo por nacer durante el embarazo.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA SÍFILIS?

La sífilis es una enfermedad de las etapas. Cada etapa se caracteriza por diferentes síntomas. Estos síntomas van y vienen, pero a menos que la sífilis se trate y cure, permanecerá en el cuerpo y puede causar daños graves con el tiempo. Las etapas son:

- **Sífilis primaria:** Aparece una llaga (o llagas) indolora llamada chancro en, alrededor o dentro del pene, la vagina, la boca o el ano. El chancro aparece 10-90 días después de la exposición. La llaga está llena de bacterias y es muy infecciosa. Muchas personas nunca notan el chancro porque es indoloro y puede estar dentro de la vagina o en algún lugar menos visible. Los chancros generalmente duran de 2 a 5 semanas y pueden desaparecer por sí solos.

- **Sífilis Secundaria:** Algunas semanas después de que desaparezcan los chancros, puede aparecer un sarpullido en el cuerpo, las manos y/o las plantas de los pies.

- **Latente Temprano:** Por lo general, no presenta síntomas y es menos probable que se transmita a la pareja sexual. Una subcategoría de sífilis latente. Cuando la infección inicial se ha producido en los 12 meses anteriores.

- **Sífilis Latente:** Los síntomas generalmente desaparecen por sí solos y es menos probable que la persona los transmita a sus parejas sexuales. Sin embargo, la enfermedad todavía está en el cuerpo y puede causar complicaciones graves.

LONG BEACH HEALTH & HUMAN SERVICES

División de Vigilancia y Control de Enfermedades Transmisibles
2525 Grand Avenue, Long Beach, CA 90815 I Teléfono: (562) 570-4321
Sitio web: http://longbeach.gov/knowmore

Hoja de Hechos
Sífilis

¿CÓMO SE TRATA LA SÍFILIS?

La sífilis se puede tratar y curar fácilmente con ciertos antibióticos, administrados en forma de inyección o píldora oral. Asegúrese de que tanto usted como su(s) pareja(s) sexual(es) completen el tratamiento antes de volver a tener relaciones sexuales. No debe intentar diagnosticarse a sí mismo ni tomar medicamentos por su cuenta.

¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIONES DE LA SÍFILIS?

Si no se trata, la sífilis puede afectar el corazón, el cerebro y otros órganos. El daño se hace evidente en la etapa final de la sífilis, conocida como sífilis terciaria o tardía. Esta etapa a menudo ocurre décadas (10 años o más) después de la infección. Las complicaciones pueden incluir daño a la piel, huesos y órganos internos; problemas neuronales que incluyen hinchazón del cerebro, ceguera, convulsiones y locura; y daño a los vasos sanguíneos y al corazón. Estas complicaciones pueden conducir a la muerte. Un bebé que nace con sífilis puede resultar en muerte fetal o defectos de nacimiento.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LA SÍFILIS INFECCIOSA?

El látex, el poliuretano y los **condones internos** ofrecen cierta protección contra la sífilis, pero es posible que no cubran todas las áreas infecciosas. Las embarazadas infectadas deben buscar atención prenatal temprana y deben hacerse la prueba de sífilis durante el primer trimestre. Si la sífilis se detecta y se trata a tiempo, la mujer embarazada puede prevenir un mortinato o defectos de nacimiento en el bebé.

RECURSOS

Departamento de Salud de Long Beach

Departamento de Salud Pública de California

Centros de Control y Prevención de Enfermedades

LONG BEACH HEALTH & HUMAN SERVICES

División de Vigilancia y Control de Enfermedades Transmisibles
2525 Grand Avenue, Long Beach, CA 90815 I Teléfono: (562) 570-4321
Sitio web: http://longbeach.gov/knowmore