Fact Sheet
Syphilis

ANO ANG SYPHILIS?

Ang syphilis ay sanhi ng isang bakteryang *Treponema pallidum*. Ang syphills ay muntik nang malipol noong taong 2000, ngunit mula noon ang Long Beach ay nakakita ng patuloy na pagtaas ng bilang. Sa kasaysayan, ang kalakaran na may pinakamataas na bilang ay ang mga lalaki na nakikipagtalik sa mga lalaki, gayunpaman, nakikita namin ang pagtaas ng mga kalakaran sa mga kababaihan. Maaaring gumaling ang Syphilis sa pamamagitan ng antibayotik. Kung hindi nabigyan ng pansin ang paggamot, ang syphilis ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa puso, utak, at iba pang mga organo. Ang pagkakaroon ng syphilis ay maaaring tumaas ang iyong mga pagkakataong maipasa o makakuha ng HIV.

SINO ANG NAKAKAKUHA NG IMPEKSYON SA SYPHILIS?

Maaaring maipasa ang syphilis sa panahon ng pakikipagtalik sa badyinal, anal, oral, balat-sa-balat na kontak sa isang taong may impeksyon sa syphilis. Ang mga buntis na may syphilis ay maaaring maipasa ito sa kanilang hindi pa isinisilang na sanggol sa panahon ng pagbubuntis.

ANO ANG MGA SINTOMAS NG SYPHILIS?

Ang Syphilis ay isang sakit na may mga yugto. Ang bawat yugto ay nailalarawan sa pamamagitan ng iba't-ibang mga sintomas. Ang mga sintomas na ito ay dumarating at umaalis, ngunit maliban kung ang syphilis ay ginagamot at gumagaling, ito ay mananatili sa katawan at maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa paglipas ng panahon. Ang mga yugto ay:

- **Pangunahing Syphilis:** Ang isang walang sakit na sugat (o mga sugat) na tinatawag na kanker ay lumalabas sa paligid o sa loob ng ari, ari, bibig, o anus. Lumilitaw ang kanker 10-90 araw pagkatapos ng pagkakalantad sa isang taong may sakit. Ang mga sugat ay puno ng bakterya at lubhang nakakahawa. Hindi napapansin ng maraming tao ang kanker dahil ito ay walang sakit at maaaring nasa loob ng ari o sa isang lugar na hindi gaanong nakikita. Ang mga kanker ay karaniwang tumatagal ng 2-5 linggo at maaaring mawala nang mag-isa.

- **Pangalaawang Yugto:** Ilang yugto pagkatapos mawala ang mga kanker, maaaring lumitaw ang pantal sa katawan, kamay, at/o talampakan ng iyong mga paa.

- **Maagang Nakatago:** Karaniwang walang sintomas at mas malamang na makahawa sa kasosyo sa pakikipagtalik. Isang sekondaryong kategoriya ng nakatagong syphilis. Kapag ang unang impeksyon ay nangyari sa loob ng nakaraang 12 buwan.

- **Pinakahuling Yugto ng Syphilis:** Ang mga sintomas ay kadalasang nawawala sa kanilang sarili at ang tao ay mas malamang na magpadala sa mga kasosyo sa pakikipagtalik. Gayunpaman, ang sakit ay nasa katawan pa rin at maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon.

LONG BEACH HEALTH & HUMAN SERVICES

Communicable Disease Surveillance and Control Division
2525 Grand Avenue, Long Beach, CA 90815 I Phone: (562) 570-4321
Website: http://longbeach.gov/knowmore

Fact Sheet
Syphilis

PAANO GINAGAMOT ANG SYPHILIS?

Ang syphilis ay madaling magamot at gumaling sa ilang partikular na antibayotik na ibinibigay bilang isang iniksyon o tabletas na iniinom. Siguraduhin na ikaw at ang iyong (mga) kasosyo sa pakikipagtalik ay kumpleto ang paggamot bago muling makipagtalik. Hindi mo dapat subukang idayagnos ang iyong sarili o uminom ng gamot sa iyong sarili.

ANO ANG MGA KOMPLIKASYON NG SYPHILIS?

Kung kinaligtaang gamutin ang syphilis, ito ay maaaring makaapekto sa puso, utak at iba pang mga organo. Ang pinsala ay nagiging maliwanag sa huling yugto ng syphilis, na kilala bilang pangatlong yugto o mga huling yugto ng syphilis. Ang yugtong ito ay madalas na nangyayari sa nakalipas na mga dekada (10 taon o higit pa) pagkatapos ng impeksyon. Maaaring kabilang sa mga komplikasyon ang pinsala sa balat, buto at panloob na mga organo; mga problema sa nyural kabilang ang pamamaga ng utak, pagkabulag, mga sishur, at pagkabaliw; at pinsala sa mga daluyan ng dugo at puso. Ang mga komplikasyon na ito ay maaaring humantong sa kamatayan. Ang isang sanggol na ipinanganak na may syphilis ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng sanggol o mga depekto sa sanggol.

PAANO MAIIWASAN ANG IMPEKSYONG SYPHILIS?

Ang latex, polyurethane, at panloob na kondom ay nag-aalok ng ilang proteksyon laban sa syphylis, ngunit maaaring hindi masakop ang lahat ng mga nakakahawang lugar. Ang mga nahawahang buntis ay dapat humingi ng prenatal na pangangalaga nang maaga at dapat na masuri para sa syphilis sa unang traymester. Kung ang syphilis ay natukoy at nagamot nang maaga, ang buntis ay maaaring maiwasan ang isang patay na sanggol sa panganganak o mga depekto sa panganganak sa sanggol.

MGA MAKUKUNAN NG TULONG

Long Beach Health Department

California Department of Public Health

Centers for Disease Control and Prevention

LONG BEACH HEALTH & HUMAN SERVICES

Communicable Disease Surveillance and Control Division
2525 Grand Avenue, Long Beach, CA 90815 I Phone: (562) 570-4321
Website: http://longbeach.gov/knowmore